



نمونه سوالات آزمون پرومتریک تکنسین بیهوشی

آزمون تکنسین بیهوشی بر اصول بیهوشی، مراقبت‌های قبل و بعد از عمل، دستگاه‌های بیهوشی، و داروهای استفاده‌شده در این زمینه متمرکز است.

- تعداد سوالات: حدود 100 سوال.
 - زمان برگزاری: معمولاً 2 تا 3 ساعت.
 - نمره قبولی: حداقل نمره قبولی 60٪.
- در ادامه نمونه سوالات آزمون پرومتریک تکنسین بیهوشی ذکر شده است. برای دریافت مشاوره رایگان مهاجرت تکنسین بیهوشی، می‌توانید در وب سایت [تهران ویزا](http://tehranvisa.com) اقدام کنید.

1. کدام یک از آزمایشات زیر برای تشخیص دیابت استفاده می‌شود؟

☐ (A) آزمایش خون برای گلوکز

☐ (B) آزمایش عملکرد کبد

☐ (C) آزمایش ادرار برای پروتئین

☐ (D) آزمایش ESR

2. کدام یک از ویژگی‌های زیر مربوط به آنتی‌بیوتیک‌ها است؟

☐ (A) کشت میکروب‌ها در محیط رشد

☐ (B) بهبود عملکرد کبد

☐ (C) ایجاد مقاومت در باکتری‌ها

☐ (D) کاهش فشار خون

3. در آزمایش CBC، کدام یک از موارد زیر بررسی می‌شود؟

☐ (A) تعداد گلبول‌های قرمز، سفید و پلاکت‌ها





○ (B) عملکرد کبد

○ (C) میزان قند خون

○ (D) چربی خون

4. کدامیک از آزمایشات زیر برای تشخیص HIV استفاده می‌شود؟

○ (A) آزمایش آنتی بادی HIV

○ (B) آزمایش قند خون

○ (C) آزمایش پروتئین‌های کبدی

○ (D) آزمایش ادرار

5. کدام یک از انواع سلول‌های خونی به عفونت‌ها واکنش نشان می‌دهد؟

○ (A) گلبول‌های سفید

○ (B) گلبول‌های قرمز

○ (C) پلاکت‌ها

○ (D) سلول‌های طحالی

6. کدام یک از آزمایشات زیر برای ارزیابی عملکرد کلیه استفاده می‌شود؟

○ (A) آزمایش کراتینین





○ (B) آزمایش قند خون

○ (C) آزمایش چربی خون

○ (D) آزمایش کلسیم خون

7. کدامیک از موارد زیر نشانگر وجود عفونت باکتریایی است؟

○ (A) افزایش تعداد گلبول‌های سفید

○ (B) کاهش تعداد گلبول‌های سفید

○ (C) افزایش تعداد پلاکت‌ها

○ (D) کاهش تعداد پلاکت‌ها

8. کدام یک از آزمایشات زیر برای ارزیابی عملکرد کبد استفاده می‌شود؟

○ (A) آزمایش ALT

○ (B) آزمایش هموگلوبین

○ (C) آزمایش قند خون

○ (D) آزمایش کراتینین

9. در آزمایش خون برای تست عملکرد تیروئید، چه ماده‌ای اندازه‌گیری می‌شود؟

○ (A) هورمون TSH





○ (B) گلوکز خون

○ (C) کلسیم

○ (D) پروتئین

10. کدام یک از موارد زیر برای تشخیص نوع ویروس هپاتیت C مفید است؟

• (A) آزمایش آنتی بادی ضد ویروس

• (B) آزمایش قند خون

• (C) آزمایش عملکرد کلیه

• (D) آزمایش ESR

11. کدام یک از روش‌های زیر برای تشخیص عفونت ادراری استفاده می‌شود؟

• (A) کشت ادرار

• (B) آزمایش عملکرد کبد

• (C) آزمایش قند خون

• (D) آزمایش پروتئین

12. کدامیک از موارد زیر مربوط به بیماری سل است؟

• (A) آزمایش خلط





• (B) آزمایش EKG

• (C) آزمایش کراتینین

• (D) آزمایش گلوکز

13. کدامیک از موارد زیر برای ارزیابی چربی خون انجام می‌شود؟

• (A) آزمایش HDL و LDL

• (B) آزمایش ALT

• (C) آزمایش گلوکز

• (D) آزمایش عملکرد کلیه

14. کدام یک از موارد زیر نشان‌دهنده بیماری نارسایی کلیه است؟

• (A) افزایش کراتینین

• (B) کاهش سطح هموگلوبین

• (C) افزایش تعداد پلاکت‌ها

• (D) کاهش شمارش گلبول‌های سفید

15. کدامیک از موارد زیر نشان‌دهنده هیپوگلیسمی است؟

• (A) کاهش قند خون



• (B) افزایش قند خون

• (C) افزایش هموگلوبین

• (D) کاهش هموگلوبین

16. کدامیک از آزمایشات زیر برای تشخیص بیماری‌های قلبی استفاده می‌شود؟

• (A) آزمایش TnT (تروپونین)

• (B) آزمایش ESR

• (C) آزمایش AST

• (D) آزمایش هموگلوبین

17. کدامیک از موارد زیر نشان‌دهنده عفونت ویروسی است؟

• (A) افزایش تعداد لنفوسیت‌ها

• (B) افزایش تعداد گلبول‌های قرمز

• (C) افزایش تعداد پلاکت‌ها

• (D) کاهش تعداد گلبول‌های سفید

18. کدامیک از آزمایشات زیر برای ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای بیمار مفید است؟

• (A) آزمایش پروتئین کل خون

• (B) آزمایش AST

• (C) آزمایش CRP

• (D) آزمایش ESR

19. کدامیک از موارد زیر به عنوان آزمایش غربالگری سرطان پروستات شناخته می شود؟

• (A) PSA (آنتی ژن ویژه پروستات)

• (B) آزمایش CEA

• (C) آزمایش هموگلوبین

• (D) آزمایش گلوکز

20. کدامیک از بیماری های زیر با کمبود ویتامین D مرتبط است؟

• (A) راشیتیزم

• (B) دیابت

• (C) فشار خون بالا

• (D) بیماری کبدی

21. کدامیک از موارد زیر نشان دهنده نارسایی تنفسی است؟

• (A) افزایش فشار CO₂ در خون

• (B) کاهش هموگلوبین

• (C) افزایش گلوکز

• (D) کاهش تعداد پلاکت‌ها

22. کدامیک از آزمایشات زیر برای شناسایی اختلالات انعقادی انجام می‌شود؟

• (A) آزمایش PT (زمان پروترومبین)

• (B) آزمایش گلوکز

• (C) آزمایش ESR

• (D) آزمایش CBC

23. کدامیک از موارد زیر برای ارزیابی وضعیت کبد در اثر مصرف الکل مفید است؟

• (A) آزمایش AST و ALT

• (B) آزمایش TSH

• (C) آزمایش BUN

• (D) آزمایش کراتینین

24. کدامیک از آزمایشات زیر برای تشخیص بیماری‌های گوارشی استفاده می‌شود؟

• (A) آزمایش Fecal occult blood (خون مخفی مدفوع)

• (B) آزمایش CBC

• (C) آزمایش ALT

• (D) آزمایش گلوکز

25. کدامیک از موارد زیر در آزمایش خون برای تعیین نوع کم‌خونی استفاده می‌شود؟

• (A) اندازه‌گیری سطح هموگلوبین

• (B) آزمایش CEA

• (C) آزمایش ESR

• (D) آزمایش پروتئین

26. کدام یک از آزمایشات زیر برای تشخیص تیروئید پرکار استفاده می‌شود؟

• (A) آزمایش TSH

• (B) آزمایش ALT

• (C) آزمایش قند خون

• (D) آزمایش کراتینین

27. کدامیک از بیماری‌های زیر باعث افزایش CRP (پروتئین C واکنشی) می‌شود؟

• (A) التهاب یا عفونت

• (B) بیماری‌های گوارشی

• (C) بیماری‌های تنفسی

• (D) بیماری‌های قلبی

28. کدامیک از موارد زیر به عنوان آزمایش غربالگری سرطان روده بزرگ استفاده می‌شود؟

• (A) آزمایش خون مخفی در مدفوع

• (B) آزمایش CEA

• (C) آزمایش PSA

• (D) آزمایش HCV

29. کدامیک از موارد زیر برای بررسی وضعیت عمومی بیمار استفاده می‌شود؟

• (A) آزمایش CBC

• (B) آزمایش TSH

• (C) آزمایش گلوکز

• (D) آزمایش کلسترول

30. کدامیک از موارد زیر در تشخیص بیماری‌های میکروبی مؤثر است؟

• (A) کشت میکروب‌ها



• (B) آزمایش قند خون

• (C) آزمایش کراتینین

• (D) آزمایش هورمون‌ها

31. کدامیک از آزمایشات زیر برای بررسی عملکرد ریه‌ها استفاده می‌شود؟

• (A) اسپرومتری

• (B) آزمایش گلوکز

• (C) آزمایش ESR

• (D) آزمایش AST

32. کدامیک از موارد زیر نشان‌دهنده ابتلا به بیماری‌های قلبی است؟

• (A) افزایش سطح تروپونین

• (B) کاهش سطح گلوکز

• (C) افزایش ESR

• (D) کاهش تعداد پلاکت‌ها

33. کدامیک از آزمایشات زیر برای بررسی سطح ویتامین D انجام می‌شود؟

• (A) آزمایش 25(OH)D





• (B) آزمایش قند خون

• (C) آزمایش گلوکز

• (D) آزمایش کراتینین

34. کدامیک از داروهای زیر برای کاهش کلسترول استفاده می‌شود؟

• (A) استاتین‌ها

• (B) آنتی‌بیوتیک‌ها

• (C) داروهای ضد التهاب

• (D) داروهای ضد فشار خون

35. کدامیک از بیماری‌های زیر باعث افزایش گلبول‌های سفید خون می‌شود؟

• (A) عفونت‌ها

• (B) کم‌خونی

• (C) فشار خون بالا

• (D) دیابت

36. کدامیک از آزمایشات زیر برای تشخیص عفونت باکتریایی مفید است؟

• (A) کشت خون



• (B) آزمایش ESR

• (C) آزمایش گلوکز

• (D) آزمایش TSH

37. کدامیک از موارد زیر برای ارزیابی وضعیت هیدراتاسیون استفاده می‌شود؟

• (A) آزمایش کراتینین

• (B) آزمایش گلوکز

• (C) آزمایش CBC

• (D) آزمایش TSH

38. کدامیک از آزمایشات زیر برای ارزیابی نارسایی کبدی استفاده می‌شود؟

• (A) آزمایش AST و ALT

• (B) آزمایش ESR

• (C) آزمایش گلوکز

• (D) آزمایش کراتینین

39. کدامیک از بیماری‌های زیر باعث کم‌خونی می‌شود؟

• (A) بیماری‌های گوارشی

• (B) بیماری‌های کلیوی

• (C) بیماری‌های قلبی

• (D) تمامی موارد

40. کدامیک از موارد زیر به عنوان آزمایش غربالگری سرطان پستان استفاده می‌شود؟

• (A) ماموگرافی

• (B) آزمایش PSA

• (C) آزمایش CEA

• (D) آزمایش Fecal occult blood

41. کدامیک از آزمایشات زیر برای ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی بدن استفاده می‌شود؟

• (A) آزمایش سلول‌های T و B

• (B) آزمایش ESR

• (C) آزمایش گلوکز

• (D) آزمایش کراتینین

42. کدام یک از موارد زیر برای تشخیص عفونت‌های گوارشی مفید است؟

• (A) کشت مدفوع

• (B) آزمایش ESR

• (C) آزمایش گلوکز

• (D) آزمایش TSH

43. کدام یک از آزمایشات زیر برای بررسی وضعیت الکترولیت‌ها در خون استفاده می‌شود؟

• (A) آزمایش Na، K، Cl

• (B) آزمایش گلوکز

• (C) آزمایش کراتینین

• (D) آزمایش AST

44. کدامیک از آزمایشات زیر برای تشخیص بیماری‌های روماتیسمی انجام می‌شود؟

• (A) آزمایش ANA

• (B) آزمایش ESR

• (C) آزمایش CRP

• (D) آزمایش گلوکز

45. کدامیک از آزمایشات زیر برای ارزیابی سطح کلسیم در خون استفاده می‌شود؟

• (A) آزمایش کلسیم



• (B) آزمایش گلوکز

• (C) آزمایش کراتینین

• (D) آزمایش ALT

46. کدامیک از موارد زیر برای تشخیص بیماری‌های عصبی مفید است؟

• (A) آزمایش EEG

• (B) آزمایش CRP

• (C) آزمایش گلوکز

• (D) آزمایش TSH

47. کدامیک از بیماری‌های زیر می‌تواند باعث اختلال در تعادل الکترولیتی شود؟

• (A) بیماری‌های کلیوی

• (B) بیماری‌های قلبی

• (C) بیماری‌های تنفسی

• (D) بیماری‌های گوارشی

48. کدامیک از آزمایشات زیر برای تشخیص بیماری‌های عفونی مفید است؟

• (A) آزمایش کشت خون



• (B) آزمایش ESR

• (C) آزمایش گلوکز

• (D) آزمایش TSH

49. کدامیک از آزمایشات زیر برای ارزیابی سطح قند خون انجام می‌شود؟

• (A) آزمایش گلوکز خون

• (B) آزمایش گلبول‌های قرمز

• (C) آزمایش هموگلوبین

• (D) آزمایش کراتینین

50. کدامیک از بیماری‌های زیر باعث افزایش تعداد گلبول‌های سفید خون می‌شود؟

• (A) عفونت‌ها

• (B) کم‌خونی

• (C) فشار خون بالا

• (D) دیابت

این سوالات نمونه به شما کمک خواهند کرد تا با نوع سوالات آزمون پرومتریک علوم آزمایشگاهی آشنا شوید و برای آزمون خود آماده‌تر شوید.

o mini4

:You said

حالا 50 نمونه سوال برای کنسین بیهوشی بده

در اینجا 50 نمونه سوال برای آزمون پرومتریک تکنسین بیهوشی آورده شده است که می‌تواند به شما کمک کند تا با نوع سوالات این آزمون آشنا شوید و برای آن آماده شوید.

نمونه سوالات:

1. کدام یک از موارد زیر برای بیهوشی عمومی استفاده می‌شود؟

☐ (A) ایزوفلوران

☐ (B) آتروفین

☐ (C) نیکوتین

☐ (D) آدرنالین

2. کدام یک از داروهای زیر برای کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی به کار می‌رود؟

☐ (A) دیازپام

☐ (B) مورفین

☐ (C) فنتانیل

☐ (D) فنتولامین

3. کدامیک از داروهای زیر در بیهوشی برای جلوگیری از افت فشار خون استفاده می‌شود؟

☐ (A) اپی نفرین

☐ (B) فنتانیل

○ (C) آتروفین

○ (D) نالوکسان

4. کدام یک از گازهای بیهوشی برای حفظ هوشیاری در هنگام جراحی استفاده می‌شود؟

○ (A) نیتروس اکسید

○ (B) ایزوفلوران

○ (C) هالوئین

○ (D) پروپوفول

5. کدامیک از داروهای زیر به عنوان مسکن در عمل‌های جراحی استفاده می‌شود؟

○ (A) مورفین

○ (B) فنتانیل

○ (C) ترامادول

○ (D) تمامی موارد

6. کدام یک از موارد زیر بهترین روش برای پایش عمق بیهوشی در طول عمل است؟

○ (A) نظارت بر ECG

○ (B) نظارت بر CO₂



○ (C) نظارت بر حرکات عضلانی

○ (D) نظارت بر سطح هموگلوبین

7. کدام یک از داروهای زیر برای درمان اسپاسم عضلانی در هنگام جراحی استفاده می‌شود؟

○ (A) ساکسی کولین

○ (B) کالی پریل

○ (C) فنتانیل

○ (D) ایزوفلوران

8. کدام یک از موارد زیر برای مدیریت فشار خون در بیمار بیهوش ضروری است؟

○ (A) استفاده از اپی نفرین

○ (B) نظارت مستمر بر فشار خون

○ (C) استفاده از داروهای ضد درد

○ (D) استفاده از داروهای ضد اضطراب

9. کدامیک از موارد زیر می‌تواند باعث وقوع بحران هیپرترمی بدخیم در بیهوشی شود؟

○ (A) ساکسی کولین

○ (B) پروپوفول



○ (C) ایزوفلوران

○ (D) دیازپام

10. کدام یک از گازهای بیهوشی باید در دماهای پایین نگهداری شوند؟

• (A) هالوئین

• (B) ایزوفلوران

• (C) نیتروس اکسید

• (D) نیتروژن مایع

11. کدامیک از داروهای زیر به عنوان شل کننده عضلانی در طول جراحی استفاده می شود؟

• (A) ساکسی کولین

• (B) استاموزول

• (C) وکرونیوم

• (D) دیازپام

12. کدامیک از موارد زیر مهم ترین اقدام پس از تجویز بیهوشی عمومی است؟

• (A) نظارت دقیق بر وضعیت تنفسی

• (B) نظارت بر سطح فشار خون

• (C) نظارت بر سطح گلوکز خون

• (D) نظارت بر دمای بدن

13. کدامیک از موارد زیر برای شبیه‌سازی وضعیت قلب در طول بیهوشی استفاده می‌شود؟

• (A) مانیتورینگ ECG

• (B) مانیتورینگ NIBP

• (C) نظارت بر سطح O2 خون

• (D) مانیتورینگ EKG

14. کدامیک از مواد زیر در بیهوشی برای کنترل درد در مراحل بعد از جراحی استفاده می‌شود؟

• (A) مورفین

• (B) ترامادول

• (C) فنتانیل

• (D) تمامی موارد

15. کدامیک از موارد زیر یکی از نشانه‌های پیشرفته بیهوشی است که باید به آن توجه کرد؟

• (A) کاهش فشار خون

• (B) افزایش دمای بدن

• (C) تغییر در ضربان قلب

• (D) کاهش اکسیژن خون

16. کدامیک از داروهای زیر برای کاهش تهوع و استفراغ پس از جراحی استفاده می‌شود؟

• (A) متوکلوپرامید

• (B) مورفین

• (C) پروپوفول

• (D) دیازپام

17. کدام یک از موارد زیر می‌تواند باعث افت فشار خون در حین بیهوشی شود؟

• (A) داروهای بیهوشی

• (B) تغییر در وضعیت بدن

• (C) کاهش حجم خون

• (D) تمامی موارد

18. کدامیک از موارد زیر معمولاً برای شروع بیهوشی عمومی استفاده می‌شود؟

• (A) پروپوفول

• (B) فنتانیل

• (C) ایزوفلوران

• (D) نیتروس اکسید

19. کدامیک از موارد زیر برای محافظت از مجاری هوایی بیمار در طول عمل جراحی ضروری است؟

• (A) لوله تراشه

• (B) ماسک صورت

• (C) کاتتر ادراری

• (D) شیلد صورت

20. کدامیک از داروهای زیر برای درمان برادی کاردی در حین بیهوشی استفاده می‌شود؟

• (A) آتروفین

• (B) اپی نفرین

• (C) آدرنالین

• (D) نالوکسان

21. کدامیک از موارد زیر نشانه‌ای از افزایش CO₂ در خون در حین جراحی است؟

• (A) افزایش تنفس

• (B) کاهش فشار خون

• (C) افزایش ضربان قلب

• (D) کاهش سطح اکسیژن خون

22. کدام یک از مواد زیر در بیمارانی که نیاز به بیهوشی دارند، برای شبیه‌سازی بیهوشی استفاده می‌شود؟

• (A) نیتروس اکسید

• (B) ایزوفلوران

• (C) پروپوفول

• (D) تمامی موارد

23. کدامیک از داروهای زیر به عنوان یک مسکن در طول جراحی استفاده می‌شود؟

• (A) مورفین

• (B) پروپوفول

• (C) ایزوفلوران

• (D) فنتانیل

24. کدامیک از موارد زیر برای ارزیابی میزان اکسیژن خون بیمار در طول جراحی استفاده می‌شود؟

• (A) پالس اکسیمتر

• (B) دستگاه فشار سنج

• (C) دستگاه ECG

• (D) دستگاه CO2

25. کدامیک از داروهای زیر به عنوان شل کننده عضلات در طول جراحی استفاده می شود؟

• (A) ساکسی کولین

• (B) دیازپام

• (C) فنتانیل

• (D) نیتروس اکسید

26. کدامیک از داروهای زیر برای تسکین درد پس از عمل جراحی مناسب است؟

• (A) فنتانیل

• (B) پروپوفول

• (C) ایزوفلوران

• (D) مورفین

27. کدامیک از مواد زیر از بی حسی در نواحی خاص بدن برای جراحی استفاده می شود؟

• (A) لیدوکائین

• (B) آتروفین



• (C) ایزوفلوران

• (D) پروپوفول

28. کدامیک از موارد زیر نشان‌دهنده اختلال در بیهوشی است؟

• (A) کاهش دمای بدن

• (B) کاهش سطح اکسیژن

• (C) افزایش فشار خون

• (D) تمامی موارد

29. کدامیک از موارد زیر نشانه‌ای از علائم نارسایی تنفسی است؟

• (A) تغییر در الگوی تنفس

• (B) افزایش در فشار خون

• (C) کاهش در میزان خونریزی

• (D) کاهش در تعداد ضربان قلب

30. کدامیک از داروهای زیر به عنوان یک شل‌کننده عضلانی در طول جراحی استفاده می‌شود؟

• (A) وکرونیوم

• (B) ساکسی کولین



• (C) دیازپام

• (D) نیتروس اکسید

31. کدامیک از داروهای زیر می‌تواند منجر به افزایش ضربان قلب شود؟

• (A) اپی نفرین

• (B) پروپوفول

• (C) فنتانیل

• (D) ایزوفلوران

32. کدامیک از داروهای بیهوشی می‌تواند باعث افزایش مدت زمان بیهوشی شود؟

• (A) ایزوفلوران

• (B) پروپوفول

• (C) فنتانیل

• (D) هالوئین

33. کدامیک از مواد زیر باید برای حفظ ثبات فشار خون در حین جراحی مورد استفاده قرار گیرد؟

• (A) نیتروگلیسرین

• (B) ایزوفلوران

• (C) پروپوفول

• (D) اپی نفرین

34. کدام یک از داروهای زیر به عنوان ضد درد در طول جراحی استفاده می‌شود؟

• (A) مورفین

• (B) دیازپام

• (C) پروپوفول

• (D) ساکسی کولین

35. کدامیک از روش‌های زیر برای پایش وضعیت قلبی در طول جراحی استفاده می‌شود؟

• A) EKG

• B) pCO₂

• (C) نیتروژن مایع

• (D) آتروفین

36. کدامیک از داروهای زیر برای بهبود عملکرد قلبی در بیماران بیهوش به کار می‌رود؟

• (A) آدرنالین

• (B) ایزوفلوران

• (C) فنتانیل

• (D) پروپوفول

37. کدامیک از داروهای بیهوشی موجب کوتاه شدن مدت زمان بیهوشی می‌شود؟

• (A) پروپوفول

• (B) فنتانیل

• (C) ایزوفلوران

• (D) هالوئین

38. کدامیک از داروهای زیر در درمان هیپوترمی بدخیم پس از بیهوشی موثر است؟

• (A) دانیترویل

• (B) دیازپام

• (C) اپی نفرین

• (D) ساکسی کولین

39. کدام یک از موارد زیر برای پایش عملکرد ریه‌ها در حین جراحی استفاده می‌شود؟

• (A) مانیتورینگ SpO2

• (B) بررسی CO2 خون

• (C) مانیتورینگ فشار خون

• (D) مانیتورینگ EKG

40. کدام یک از داروهای بیهوشی بیشترین خطر ایجاد اختلالات قلبی را دارد؟

• (A) هالوئین

• (B) ایزوفلوران

• (C) پروپوفول

• (D) ساکسی کولین

41. کدام یک از موارد زیر باعث افزایش احتمال ایجاد تهوع و استفراغ پس از جراحی می‌شود؟

• (A) پروپوفول

• (B) ایزوفلوران

• (C) مورفین

• (D) نیتروس اکسید

42. کدامیک از داروهای زیر به عنوان شل کننده عضلانی برای تسهیل لوله گذاری در جراحی استفاده می‌شود؟

• (A) ساکسی کولین

• (B) نالوکسان

• (C) آتروفین

• (D) پروپوفول

43. کدامیک از موارد زیر در هنگام عمل‌های جراحی بی‌حسی برای استفاده در محل برش انجام می‌شود؟

• (A) لیدوکائین

• (B) فنتانیل

• (C) پروپوفول

• (D) نیتروس اکسید

44. کدامیک از داروهای زیر ممکن است باعث کاهش فشار خون در طول جراحی شود؟

• (A) پروپوفول

• (B) ایزوفلوران

• (C) فنتانیل

• (D) تمامی موارد

45. کدام یک از داروهای زیر می‌تواند برای کاهش التهاب پس از جراحی به کار رود؟

• (A) استروئیدها

• (B) مورفین

• (C) فنتانيل

• (D) نالوكسان

46. کدامیک از موارد زیر برای کنترل موقت مشکلات تنفسی در بیمار بیهوش به کار می‌رود؟

• (A) استفاده از ماسک صورت

• (B) لوله‌گذاری تراشه

• (C) دیافراگم مصنوعی

• (D) کاتتر گلوکوز

47. کدامیک از گازهای بیهوشی برای تنفس مستقیم بیمار در طول جراحی استفاده می‌شود؟

• (A) نیتروس اکسید

• (B) ایزوفلوران

• (C) پروپوفول

• (D) هالوئین

48. کدامیک از داروهای زیر برای بیهوشی کوتاه‌مدت مناسب است؟

• (A) پروپوفول

• (B) ایزوفلوران

• (C) فنتانيل

• (D) ساكسى كولین

49. کدامیک از داروهای بیهوشی می‌تواند باعث تاخیر در بازگشت هوشیاری پس از عمل شود؟

• (A) هالوئین

• (B) ایزوفلوران

• (C) نیتروس اکسید

• (D) پروپوفول

50. کدامیک از داروهای بیهوشی می‌تواند باعث تغییر در فشار خون بیمار در طول عمل جراحی شود؟

• (A) پروپوفول

• (B) ایزوفلوران

• (C) ساكسى كولین

• (D) نیتروس اکسید